

Supravac® 10

Supravac® 10

Vacina contra Rinotraqueíte Infecciosa, Diarreia Viral Bovina Tipo 1 e 2, Vírus Respiratório Sincicial, Parainfluenza, Leptospiroses e Pasteurelose Bovinas

USO VETERINÁRIO



50 mL


Dechra

COMPOSIÇÃO: É uma suspensão contendo vírus inativados por betapropiolactona de BVD-Diarreia Viral Bovina Tipo 1 amostra citopática e não citopática, BVD Diarreia Viral Bovina Tipo 2 amostra citopática, IBR-Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, BRSV-Vírus Respiratório Sincicial Bovino, PI3-Parainfluenza Bovina tipo 3 e bacterinas do cultivo de *Pasteurella haemolytica*, *Leptospiras pomona*, *canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *hardjo*, *wolffii* e *grippotyphosa*, mortos pelo formol e calor e adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio como adjuvante. **INDICAÇÃO:** Na profilaxia das enfermidades respiratórias e reprodutivas bovinas causadas pelos vírus BVD (Diarreia Viral Bovina), IBR (Rinotraqueíte Infecciosa Bovina), BRSV (Vírus Respiratório Sincicial Bovino), PI3 (Parainfluenza Bovina tipo 3), das bactérias *Pasteurella haemolytica*, *Leptospiras pomona*, *canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *hardjo*, *wolffii* e *grippotyphosa*. **DOSES E MODO DE USAR: Dose:** 5 mL via subcutânea. **Em animais primovacinados (animais não vacinados anteriormente):** fazer uma dose e repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose. **Bezerros:** fazer a primeira dose aos 4 meses e repetir a dose após 30 dias. Revacinar semestralmente com uma dose. A imunidade se efetivará 21 dias após a última revacinação. **CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:** Recomenda-se, para um melhor controle da sanidade do rebanho, testes diagnósticos para determinar quais agentes podem estar acometendo o rebanho quando houver desordens reprodutivas e respiratórias. Não vacinar animais doentes e debilitados. A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse comprometem o desenvolvimento de uma resposta imunológica sólida e duradoura. **Conservar a vacina em temperatura entre 2 °C e 8 °C, até o momento da aplicação.** Não congele o produto. Verificar o prazo de validade do produto. Agitar vigorosamente o frasco antes e durante a aplicação da vacina. Desinfetar o local da aplicação da vacina e usar agulhas e seringas estéreis. O uso concomitante (ou nos dias que antecedem e sucedem a vacinação) com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. Em caso de choque anafilático usar epinefrina ou equivalente. Recomenda-se que a vacinação seja efetuada após a comprovação laboratorial do complexo viral das enfermidades no rebanho. Venda sob prescrição do médico veterinário. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não vacinar animais 21 dias antes do abate. Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.629 em 12/06/03. Proprietário e fabricante: **Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda.** Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves - CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brasil - CNPJ: 79.578.266/0001-76. Indústria Brasileira. **SAC: 0800 400 7997** - www.dechra.com.br. Responsável Técnica: Drª. Vera Lúcia Fernandes. CRMV-PR nº 3.014.



Nº 139-6

Part: 000/00

Fabr: XXX/00

Venc: XXX/00