

Sincro eCG® 6000

Uso Veterinário

Gonadotrofina coriônica equina injetável (eCG)

Fórmula:

Frasco:

eCG (gonadotrofina coriônica equina - liofilizado) 6.000 UI

Frasco com diluente:

Diluente estéril 30 mL

Indicações principais:

A gonadotrofina coriônica equina (eCG) possui atividade foliculo estimulante e luteinizante, o que lhe confere possibilidade de uso no controle da reprodução e em processos patológicos reprodutivos.

Indicado para a estimulação do crescimento folicular levando assim a uma maior capacidade ovulatória, maximizando a taxa de prenhez, podendo ainda ser utilizada para superovulação de fêmeas bovinas.

Modo de uso e dosagens:

Para diluição, adicionar de 2 a 3 mL do diluente estéril no frasco contendo o liofilizado de 6.000 UI de eCG, homogeneizar e devolver o volume com o liofilizado ao frasco de diluente.

Repetir o procedimento, caso necessário.

Doses:

Estimulante de desenvolvimento folicular:

Administrar uma dose de 300 UI/animal, ou seja, 1,5 mL de **Sincro eCG 6000** por via intramuscular profunda.

Indutor de múltiplas ovulações:

Administrar uma dose de 500 UI/animal, ou seja, 2,5 mL de **Sincro eCG 6000** por

via intramuscular profunda.

A resposta da utilização de medicamentos hormonais depende do bom estado corporal em que o animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, consequentemente, são muito mais influenciadas pelo meio. Uma vez que os protocolos terapêuticos reprodutivos são bastante diferenciados, fica a critério do médico-veterinário a definição da melhor combinação farmacológica para o protocolo reprodutivo a ser adotado.

Contraindicações e limitações de uso:

O uso de **Sincro eCG 6000** é contraindicado para animais com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula, assim como em fêmeas prenhes.

Não utilizar o produto em animais que não estejam em idade reprodutiva. Doses elevadas produzem superovulação, não sendo aconselhável para animais a serem inseminados ou cobertos (monta natural) em virtude da possibilidade de gestações múltiplas. Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Precauções em animais:

Uso exclusivo em fêmeas bovinas.

Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luvas nitrílicas). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Utilizar seringas e agulhas estéreis, observando as boas práticas de assepsia e adotando os devidos cuidados na manipulação.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Ver a bula atentamente antes de administrar o produto.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DO LEITE DOS BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Reações adversas:

O produto, quando usado nas dosagens indicadas, não provoca reações adversas. Entretanto, reações de

hipersensibilidade individual podem ocorrer. Nestes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Pode ocorrer edema transitório no local de administração, geralmente sem a necessidade de tratamento.

Conservar o produto na embalagem original, sob refrigeração, em temperatura entre 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após reconstituição, o produto poderá ser mantido por até 7 dias sob refrigeração em temperatura de 2°C a 8°C.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000005-1.000032 em 18/02/2021.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

PRODUTO IMPORTADO

Proprietário:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



13000559 / 0521 0500



Atendimento
16 3518 2025



Whats SAC
16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

Fabricante:

Ningbo Second Hormone Factory
No. 28, Renjian Road
Zonghan Subdistrict Cixi, Ningbo
Zhejiang Province - China



XXXXXX
XXXXXXXXXX
FSC® XXXXXXXX