

# Moxi Duo<sup>®</sup>

## Uso Veterinário

### Fórmula:

Cada seringa de 9,60 g contém:	
Moxidectina .....	0,240 g
Praziquantel .....	1,490 g
Vitamina E .....	0,600 g
Veículo q.s.p. ....	9,600 g

### Indicações principais:

O produto é indicado para o controle de parasitas internos de equinos.

**Helmintos:** *Habronema muscae*, *Trichostrongylus axei*, *Oxyuris equi*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus serratus*, *Probstmayria vivipara* e *Cyathostominae*.

### Modo de Uso e Dosagens:

**Moxi Duo** deve ser administrado por via oral, exclusivamente para equinos, aplicada sobre a língua do animal, no fundo da boca, que deve estar sem alimento, na dosagem de 1,6 g para cada 100 kg de peso, obedecendo à graduação que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa é suficiente para tratar 600 kg de peso corporal. Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos.

As doses são graduadas para: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg e 600 kg. Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo

médico-veterinário.

### Contraindicações:

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto.

Não aplicar em potros com idade inferior a 6 meses.

Não administrar o produto em animais destinados ao abate.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

### Precauções em animais:

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Procure um médico-veterinário para mais informações acerca do controle de parasitoses.

Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes.

### Precauções em humanos:

Cuidado! Pode ser irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto. Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas.

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA EQUÍDEOS (*Equus caballus*/CAVALOS) ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Interações Medicamentosas:

Não misturar a outros produtos.

Não administrar Moxidectina junto a drogas como Cetoconazol, Itraconazol, Ciclosporina e bloqueadores de canal de cálcio.

O uso concomitante com Dexametasona reduz a eficácia do Praziquantel.

#### Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações

de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Em um estudo utilizando até três vezes a dose terapêutica recomendada não houve alteração dos parâmetros clínicos, hematológicos e bioquímicos. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

#### Informações para uso médico:

**Grupo químico:** Milbemicina/Derivativo Pirazinoisoquinolina;

**Ingrediente ativo:** Moxidectina/Praziquantel;

**Ação Tóxica:** Agonista do GABA/Atividade sobre as enzimas Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATPase e Ca<sup>2+</sup>/Mg<sup>2+</sup> ATPase, aumentando a permeabilidade da membrana;

**Antídoto/Tratamento:** Não há antídoto específico. Efetuar tratamento sintomático

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.611 em 21/07/2011.

#### Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

**Proprietário e fabricante:**  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofino.saudeanimal.com](http://www.ourofino.saudeanimal.com)  
Indústria brasileira



50003348/0620 OF00