

Desflan[®]

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Flunixinina (Meglumina) 5,0 g

Veículo q.s.p. 100,0 mL

Indicações:

Desflan é um potente analgésico, não-narcótico, não-esteróidico, com atividade anti-inflamatória e antipirética, recomendado para todos os casos de dor, febre e/ou inflamação, para bovinos e equinos.

Modo de uso e dosagens:

Desflan deve ser aplicado por injeção intramuscular ou intravenosa, nas seguintes recomendações:

Para equinos:

Desordens músculo-esqueléticas:

1 mL de **Desflan** (1,1 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo por dia.

O tratamento pode ser repetido durante 5 dias consecutivos.

Alívio da dor associada com cólicas:

1 mL de **Desflan** (1,1 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo por dia. Neste caso a via intravenosa é

recomendada para pronta ação, o que pode ocorrer dentro de 15 minutos ou menos. O tratamento

pode ser repetido se reaparecerem sinais de cólicas.

A causa da cólica deve ser determinada e tratada

concomitantemente com a terapêutica indicada para a mesma.

No choque endotóxico:

1 mL de **Desflan** (1,1 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo, por via intravenosa.

Para bovinos:

Diarreia dos recém-nascidos:

2-3 mL de **Desflan** (2,2 a 3,3 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo por dia, via intramuscular ou intravenosa.

Geralmente uma única aplicação é efetiva.

Na mastite colibacilar ou choque endotóxico:

1 mL de **Desflan** (1,1 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo, por via intravenosa. Continuar o tratamento por 3 dias, na mesma dosagem, utilizando a via intramuscular.

Desordens músculo-esqueléticas:

1 mL de **Desflan** (1,1 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo, por via intravenosa ou intramuscular. O tratamento pode ser repetido durante 5 dias consecutivos.

Para outras indicações, utilizar 2 mL de **Desflan** (2,2 mg/kg) para cada 45 kg de peso corpóreo por dia.

Precauções:

Obedecer rigorosamente às indicações e às dosagens para a aplicação do produto.

Deve-se tomar cuidado para evitar a aplicação intra-arterial do produto.

Contraindicações e limitações de uso:

Bovinos: não usar em touros reprodutores.

Não usar em vacas leiteiras em lactação ou secas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

VITELA: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BEZERROS DESTINADOS A VITELA PARA O CONSUMO HUMANO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

EQUÍDEOS

(Equus caballus/ CAVALOS)

ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações medicamentosas:

Não associar ou usar

concomitantemente com outros anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) ou glicocorticoides. Não usar concomitantemente com diuréticos.

Efeitos adversos:

A superdosagem do produto pode causar depressão do sistema nervoso central, diarreias, insuficiências renais agudas, distúrbios hematológicos, indiferença, anorexia.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, entre 5°C e 30°C, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.845 em 03/07/2001.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



50003219/0918 0100