

Sincrogest[®]

Injetável

Uso Veterinário

Progesterona Injetável

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Progesterona 15,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

A progesterona é um hormônio esteroide e determina a duração do ciclo estral por meio do bloqueio da secreção do hormônio liberador das gonadotrofinas (GnRH) no hipotálamo e consequentemente de LH e a ovulação.

Sincrogest Injetável tem ampla utilização na medicina veterinária quando se precisa reproduzir o efeito de progestágenos naturais. É indicado para fêmeas bovinas na sincronização de onda folicular na utilização

em conjunto com estrógenos. Tal associação determina a atresia de folículos e emergência de uma nova onda folicular.

Modo de Uso e Dosagem:

Aplicar **Sincrogest Injetável** pela via intramuscular profunda na dosagem de 1,0 mL (150 mg de progesterona) em dose única.

A resposta da utilização de medicamentos hormonais depende do bom estado corporal em que o

animal se encontra e da ausência de causas de baixa fertilidade como doenças reprodutivas e endócrinas. Um correto manejo nutricional na propriedade é imprescindível, uma vez que as características reprodutivas são de baixa herdabilidade e, conseqüentemente, são muito mais influenciadas pelo meio.

Contraindicações e limitações de uso:

Não aplicar em bezerras sexualmente imaturas. Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido. Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto.

Precauções em humanos:

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica). Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não misturar a outros produtos.

Obedecer ao modo de aplicação do produto. Utilizar agulhas e seringas esterilizadas, observando as boas práticas de assepsia.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Interações medicamentosas:

O metabolismo das progesterinas, entre elas a progesterona, pode aumentar quando administradas

juntamente com a rifampicina, visto que este é um potente indutor das enzimas do citocromo P450 presentes no fígado.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.677 em 26/04/2012

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



PAPEL

50004561/1020 O'FOO



Atendimento
16 3518 2025



WhatsApp
16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

ourofino
saúde animal