

Lepecid[®] BR spray

Uso Veterinário

Mata Bicheira

Agite antes de usar.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Clorpirifós 5,00 g

Veículo q.s.p. 100,0 mL

Gás Propelente:

Butano/Propano 163 g por lata

Indicações principais:

Lepecid BR Spray é indicado como auxiliar no controle às miíases cutâneas (bicheiras) de bovinos.

Dosagens e Modo de uso:

Agite antes de usar.

Aplicar o produto em toda a área afetada, bem como ao seu redor, mantendo o tubo de "spray" a uma distância de 10 - 20 cm da região a ser tratada.

Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo e características genéticas ou raciais podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, a critério do médico-veterinário.

Contraindicações:

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Precauções em animais:

Administração exclusiva por via tópica. Durante a aplicação, evitar contato do produto com olhos e boca do animal. Evitar aplicar o produto em horas de calor

intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

A intoxicação por anticolinesterásicos como os organofosforados compreende uma série de sinais característicos como sialorreia, vômito, sudorese, cólicas abdominais, diarréia, bradicardia, broncoconstrição, incontinência urinária, tremores, fraqueza muscular, prostração e convulsões.

Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O

Informações para uso médico:

Grupo químico: Composto

organofosforado;

Ingrediente ativo: Clorpirifós;

Ação Tóxica: Inibição da enzima colinesterase;

Antídoto/Tratamento: Sulfato de atropina e reativadores de colinesterase.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.825 em 10/07/2014.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

*** Indicação quantitativa atendendo a Portaria nº 75, de 19 de maio de 1999 do INMETRO**

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Pode ser fatal se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas. Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não utilizar equipamento com vazamento. Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com a boca.

Não aplicar o produto contra o vento.

Não aplicar próximo a chamas.

Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou

domésticos.

Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo, antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Não reutilizar as embalagens. Não perfurar as embalagens vazias. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Interações medicamentosas:

A presença de outros compostos químicos pode alterar a toxicidade dos organofosforados. Dentre estes compostos podemos citar drogas que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de magnésio, outros agentes bloqueadores neuromusculares e drogas que competem com os organofosforados por esterases-alvo (succinilcolina, fenotiazina e procaina).

CUIDADO  **VENENO**

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria brasileira



 Atendimento
16 3518 2025

 WhatsApp SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



Fabricante:
Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares km 113, Caixa 611
Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra-SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

 **ourofino**
saúde animal